

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Matrigon i radis til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5 og, §10, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Vejledning for Matrigon i radis til frøavl

Ukrudtsmiddel:

“Må kun anvendes i radis til frøavl.”

“Halm og andre rester må ikke opfodres.”

Advarsel:

“Se Matrigon etiketten.”

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Matrigon i radis til frøavl

Skadegører:

Kamille, brandbæger og andre kurvblomstrede.

Sprøjtetidspunkt og dosering:

Bredsåede afgrøder

Efter fremspiring, når radiserne har 6 blade. Afgrøden skal dække mindst 60 pct. af jordoverfladen. 0,8 liter Matrigon pr. ha. Maks. hvert 4. år.

Rækkesåede afgrøder

Ukrudt 2-4 blade. Båndsprøjtning med 1,0 liter Matrigon pr. ha i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand. Maks. hvert 4. år.

Pletsprøjtning

Tidsej. Pletsprøjtning med 1,0 liter Matrigon pr. ha. Tidsejletter må max udgøre 25 pct. af hver hektar. Maks. hvert 4. år.

For at opnå den bedste effekt skal ukrudtsplanterne være i god vækst, luftfugtigheden skal være høj, og temperaturen skal være over 15 °C.

Risiko for skade:

For at kunne tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg:

Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Matrigon til radis til frø efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Dow AgroSciences Danmark A/S:

Dow AgroSciences Danmark A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Dow AgroSciences Danmark A/S kan på ingen måde drages til ansvar.