

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Starane 180 S og Tomahawk 180 EC i spinat til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og, § 10, [Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Vejledning for Starane 180 S og Tomahawk 180 EC i spinat til frøavl

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i spinat til frøavl
- Halm og andre rester må ikke opfodres
-

Advarsel:

"Se Starane 180 S/ Tomahawk 180 EC etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Starane 180 S Tomahawk 180 EC i spinat til frøavl

Starane 180 S / Tomahawk 180 EC bør kun anvendes, hvor der er behov for bekæmpelse af burresnerre.

Dosering:

Der anvendes 0,2 l Starane 180 S / Tomahawk 180 EC pr. ha når spinaten har 4-6 blade, eller

2 x 0,15 l Starane 180 S / Tomahawk 180 EC pr. ha ved en splitbehandling. Ved splitbehandling gennemføres første behandling når spinaten har 4-6 blade og anden behandling ca. 7 dage senere.

For at opnå en god effekt skal burresnerreplanterne mindst have en krans blivende blade

Sprøjtetidspunkt:

Behandlingerne skal altid gennemføres inden spinaten har 6-8 blade og/eller der fremkommer frøstande på spinaten.

Der må kun sprøjtes på planter i god vækst, og der må ikke være udsigt til at planterne kan komme til at mangle vand.

Risiko for skade:

Det sker ofte, at væksten i spinaten går i stå og planterne bliver slappe efter behandling med Starane 180 S / Tomahawk 180 EC. Det tager ca. 1 uge inden planterne igen kommer i normal vækst. Der er i forsøg konstateret udbyttetab på 10-20 pct., hvor Starane 180 S / Tomahawk 180 EC har været anvendt.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger Århus universitet Forskningscenter Flakkebjerg:

Ud fra modtaget dokumentation og medsendte vejledning kan Starane 180S/ Tomahawk 180 EC anbefales anvendt i Spinat til frøavl.

Bemærkninger fra Dow AgroSciences / Makhreskim-Agan

Firmaerne har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Starane 180 S / Tomahawk 180 EC i spinat til frøavl, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Firmaerne kan på ingen måde drages til ansvar.

