

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Totril I purløg til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og, § 10, [Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Totril i purløg til frøavl

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i purløg til frøavl.
- Halm og andre rester må ikke opfodres.

Advarsel:

"Se [Totril](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Totril i purløg til frøavl

Skadegører:

Bredbladet frøukrudt.

Etableringsår:

Dosering og sprøjtetidspunkt:

Efter afgrødens fremspiring anvendes 0,1-0,2 l Totril pr. ha. Behandlingen gentages så snart nyt ukrudt spirer frem.

Når de første rigtige blade er 4-6 cm lange, kan doseringen hæves til 0,4 l pr. ha.

Når det første blivende blad er 10 cm langt, kan der eventuelt blandes med 0,2 l Fenix + 0,2 l Totril pr. ha.

Frøavlsåret

Dosering og sprøjtetidspunkt:

I frøavlsåret kan doseringerne hæves lidt, så der anvendes 0,3- 0,4 l pr. ha allerede ved de første behandlinger.

Begrænsninger i anvendelsen:

Der må maksimalt anvendes 1,75 l Totril pr. ha. pr. år.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger:

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg

Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale ukrudtsmidlet Totril anvendt i purløg til frø ud fra den medsendte vejledning.

Bemærkninger fra Bayer CropScience

Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg, eller erfaringer med anvendelsen af Totril i purløg til frø, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

Dato: 23. marts 2011