

# Off-label godkendelse og vejledning i brug af Command CS i spinat til frøavl

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5 og, §10, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

## **Ansvar for off-label vejledning**

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

### *Off-label vejledning - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landkontoret for Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Landskontoret for Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

## Vejledning for Command CS i spinat til frøavl

### *Ukrudtsmiddel:*

“Må kun anvendes i spinat til frøavl”

“Halm og andre rester må ikke opfodres”

### *Advarsel:*

“Se Command CS-etiketten”

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

### **Brugsanvisning for Command CS i spinat til frøavl**

Command CS har god effekt på burrester, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

### *Dosering:*

Der anvendes 0,25 l Command CS pr. ha, efter såning og senest 3-5 dage før spinaten spirer frem.

Command CS kan anvendes ved udlæg af spinat om efteråret og om foråret.

### *Risiko for skade:*

For at mindske risikoen for skade skal spinaten sås i 2-2,5 centimeters dybde og frøene skal dækkes.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre skader på spinaten. Disse skader vil ofte forværres af efterfølgende Betanal sprøjtninger.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

### *Bemærkninger fra BASF A/S*

BASF A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Command CS i spinat til frøavl, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. BASF A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Januar 2004