

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) mod kurvblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES Innovation P/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) mod kurvblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion

### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod kurvblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøavl på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadium 50
- For at beskytte grundvand: Max 1 behandling pr. areal hvert 4. år på samme areal
- Må i radise, beder, timian og purløg ikke anvendes senere end i maj måned
- Halm og rester må ikke opfodres
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel: Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides  
"Se Matrigon 72 etiketten"

### Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)
Korsblomstret havefrø, olieræddike og gul sennep til frøavl	Kamille, Brandbæger og andeturveblomstret ukrudt	Bredsåede afgrøder: 110 g/ha*  Rækkesåede afgrøder: 140 g/ha* Båndsprøjtning i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand	100-300 L/ha	1 gang hver 4. år	Bredsåede afgrøder: Afgrødens stadium 31-50  Rækkesåede afgrøder: når ukrudtet har 2-4 blade udfoldet
Radise og beder til frøavl	Kamille, Brandbæger og andeturveblomstret ukrudt	Bredsåede afgrøder: 110 g/ha  Rækkesåede afgrøder: 140 g/ha Båndsprøjtning i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand	100-300 L/ha	1 gang hver 4. år	Bredsåede afgrøder: Efter fremspiring når afgrøden har 6 blade  Rækkesåede afgrøder: når ukrudtet har 2-4 blade udfoldet  Må ikke anvendes senere end maj
Timian og purløg til frøavl	urveblomstret ukrudt, specielt tidslær	Rækkesåede afgrøder: 140 g/ha Båndsprøjtning i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand	100-300 L/ha	1 gang hver 4. år	Rækkesåede afgrøder: når ukrudtet har 2-4 blade udfoldet  Må ikke anvendes senere end maj

\*) Tilsætning af olie anbefales.

*Sprøjteteknik/udstyr:* Alm. marksprøjte (traktormonteret).

*Risiko for skade:*

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 17. marts 2023