

Anbefalinger for personhygiejne for servicepersonale på ejendomme

Ring på tlf. _____
for adgang i besætningen
uden forudgående aftale.

Smitterisiko 1

Smitterisiko 1 - alle besætninger

Ved færdsel i staldafsnit **skal** der bruges:

- Rent tøj og gummistøvler

Ved færdsel i staldafsnit **bør** der bruges:

- Besætningens fulddækkende skiftetøj og gummistøvler, eller
- Medbragt fulddækkende rent skiftetøj/engangstøj.

Husk:

- Desinfektion af medbragte gummistøvler efter brug
- Desinfektion af vaskbare overflader på udstyr, som tages med i staldafsnit
- Brug handsker/vask hænder

Smitterisiko 2

Smitterisiko 2 - fx B-streptokokker

Ved færdsel i staldafsnit **skal** der bruges:

- Besætningens fulddækkende skiftetøj og gummistøvler
Medbragt rent og fulddækkende skiftetøj/engangstøj*

Husk:

- Desinfektion af vaskbare overflader på udstyr, som tages med i staldafsnit
- Brug handsker/vask hænder

Smitterisiko 3

Smitterisiko 3 - fx salmonella niveau 2+3, salmonellose, BVD eller klinisk udbrud med mycoplasma bovis

Ved færdsel i staldafsnit **skal** der bruges:

Besætningens fulddækkende skiftetøj og gummistøvler
Medbragt rent og fulddækkende skiftetøj/engangstøj*

Husk:

- Desinfektion af vaskbare overflader på udstyr, som tages med i staldafsnit
- Brug handsker/vask hænder
- Ejendommen besøges sidst på ruten/dagen/ugen

Smitterisiko 4

Smitterisiko 4 - fx mund- og klovesyge

Kun besøg af besætningens dyrlæge og Fødevarestyrelsens veterinærenheder efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

* Ved manglende besætningsstøvler:

Brug egne gummistøvler, der vaskes med sæbe og desinficeres før og efter besøg.
Disse støvler bør udelukkende bruges i besætninger med samme eller lavere sundhedsstatus.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Scan for at læse om korrekt rengøring af gummistøvler →



Oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau

Mistanke eller smitte med:	Besøgsregler:	Zoonose (smitte mellem mennesker og dyr):
Besøgsniveau 4		
Mund- og klovesyge	Ingen adgang	Nej
Oksens ondartede lungesyge	Ingen adgang	Nej
IBR	Ingen adgang	Nej
Rift valley feber	Ingen adgang	Ja
Brucellose (smitsom kalvekastning)	Ingen adgang	Ja
Vesikulær stomatitis	Ingen adgang	Nej
Lumpy skin disease (LSD)	Ingen adgang	Nej
Miltbrand	Ingen adgang	Ja
Aujesky	Ingen adgang	Nej
Rabies	Sidst på ruten	Ja
Bluetongue	Sidst på ruten	Nej
BVD	Sidst på ruten	Nej
Salmonellose og salmonella niveau 2+ 3 (OT)	Sidst på ruten	Ja
Kvægtuberkulose	Sidst på ruten	Ja
Leukose	Sidst på ruten	Nej
Mycoplasma bovis klinisk udbrud	Sidst på ruten*	Nej
BSE	Støvle- og tøjskifte**	Ja
Hydatidose	Støvle- og tøjskifte**	Ja
Leptospirose	Støvle- og tøjskifte**	Ja
B-streptokokker	Støvle- og tøjskifte	Ja
Paratuberkulose	Støvle- og tøjskifte*	Nej

* Mycoplasma bovis og paratuberkulose er ikke anmeldelsespligtige sygdomme, men ved kendskab til forekomst af sygdommen i besætningen bør der tages forholdsregler.

** Det er ikke nødvendigt at foretage besætningsbesøget sidst på ruten trods offentligt tilsyn.

Først sæbe – så desinfektion

Desinfektionsmiddel ødelægges af organisk materiale (skidt).
Så desinfektion uden forudgående vask med sæbe har kun ringe effekt.

Eksempler på sæber og brugsopløsning, der kan anvendes til vask af støvler og udstyr i kvægsætninger

Sæbeprodukt	Brugsopløsning	Producent/leverandør	Forhandler
Bio gel	2,0 %	CID LINES (Belgien)	Fx DLG
Ewers Agroxen	1,0 %	Brødr. Ewers	Brødr. Ewers
Densintec StallClean Profi	2,0 %	VitaVis (Tyskland)	Fx ViloFarm, Danish Agro
Shift	1,0 %	Evans	Fx Bella Staldrens
Novaclean	2,5 %	Novadan	Fx Grene

Desinfektionsmetoder

- Varmebehandling er en effektiv desinfektionsmetode
- Kemisk desinfektion er ligeledes effektiv. Effekten afhænger af:
 - Hvor rent det man desinficerer er - og desinfektionsmidlets følsomhed over for skidt
 - Kontakttid (hvor længe overfladen skal være fugtig ved anvendt koncentration), hvilket afhænger af produkt
 - Omgivelsernes temperatur og midlets virkning ved den givne temperatur og brugte koncentration.

Eksempler på midler og brugsopløsning, der kan anvendes til desinfektion af støvler og udstyr i kvægsætninger

Eksempler på dokumenterede desinfektionsmidler med vejledende brugskoncentrationer

Desinfektionsmiddel	Brugsopløsning	Producent/leverandør	Forhandler
Vikon S	1,0 %	Pharmaxim	Fx Linds
Kickstart	1,0 %	CID LINES (Belgien)	Fx DLG
Oxykol	1,0 %	Brødr. Ewers	Brødr. Ewers
Bayocide	2,0 %	Bayer	Fx Bayer, Linds, P. Lindberg, DLG
Desintec Peroxx Liquid	1,5 %	VitaVis (Tyskland)	Fx ViloFarm, Danish Agro
PerOxytabs II	0,5 %	CID LINES (Belgien)	Fx DLG
Perradox	1,0%	Evans	Fx Bella Staldrens
Des Foam Paa	2,0 %	Novadan	Fx Linds