

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pixxaro EC (64-87) mod ukrudt i spinat til frøproduktion

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlanteInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Pixxaro EC (64-87) mod ukrudt i spinat til frøproduktion

## Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i spinat til frøproduktion
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder fluroxypyr.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter

## Advarsel:

”Se Pixxaro EC etiketten”

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

*Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist*

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt	Vandmængde
Spinat til frøavl	Ukrudt	Max 0,125 L/ha  <u>Eller ved splitbehandling</u> 1. behandling 0,05 L/ha  2. behandling 0,075 L/ha	1  Eller 2 ved splitbehandling	4 – 6 bladsstadiet (BBCH 14-16)  <u>Ved splitbehandling:</u> 1. behandling på spinatens 2-4 bladstadiet (BBCH 12-14)  2. behandling 2-3 uger senere	100-300 L/ha

*Sprøjteteknik/udstyr:* Marksprøjte (bomsprøjte).

*Risiko for skade:* Forsøg har vist, at spinat kan skades alvorligt ved for høj dosering i forhold til plantens udviklingstrin, og visse sorter er særligt følsomme. Det er derfor et krav at avleren kun anvender Pixxaro EC i spinat efter aftale og rådgivning fra frøfirmaet.

Doseringerne skal altid tilpasses afgrødens udviklingstrin. Stressede afgrøder bør ikke behandles.

## *Sprøjtetidspunkt:*

Det er vigtigt at behandlingen tilpasses spinatens udviklingstrin uanset ukrudtets størrelse.

*Dato:* 19. marts 2020