

Оптимальная репродукция

Правильный контроль охоты: После активизации хряка выполнить нижеследующее:



Время для осеменения

Для маток:

- 1. осеменение не позже 12 часов после начала охоты
- 2. осеменение через 24 часа после первого осеменения



Для ремонтных свиней:

- 1. осеменение каждые 12 часов после начала охоты


Всегда заполняйте контрольный лист для проверки, в охоте ли поголовье

Контрольный лист для проверки охоты

- Заполнять кодами с третьего дня после отъема
- Заполнять пока поголовье не пройдет 2 цикла осеменения
- Подводить итоги и устанавливать среднюю продолжительность охоты
- Проверять, обуславливает ли короткий период от отъема длительную охоту
- Проверять, обуславливает ли долгий период от отъема короткий период охоты
- Не забудьте, что независимо от продолжительности охоты, овуляция происходит, когда заканчивается 2/3 периода охоты
- Не забудьте, что осеменение должно производиться за 24 часа до и за 4 часа после овуляции

Правильное осеменение

- Одна половина вульвы отводится в сторону, и наконечник катетера вводится внутрь, не пачкая его
- Двигайте катетер вдоль спины
- Введя катетер во влагалище на 15 см, повернуть его (смазка)
- Двигайте катетер вперед, и потом потяните катетер немного назад
- Катетер повернуть налево (с позиции позади матки) и толкнуть вперед
- Сесть верхом на матку лицом к ее задней части
- Рукой, которой не держите дозу спермы, поднять кожу в паху. Возможна и стимуляция вымени
- Ногами стимулировать зону вокруг плечевого пояса матки
- Гель для катетера не используется. После осеменения катетер сразу убрать



Grafik: Jakob Strandberg

Правильная работа с дозами спермы

- После доставки следует сразу же вынуть дозы из ящика (купленные дозы спермы)
- Дозы поставить в климатическом шкафу до использования при температуре 16-18°C
- Для перевозки в цех осеменения дозы поместить в изолированном ящике
- Не нагревать дозы перед использованием
- Не подвергать дозы воздействию прямых солнечных лучей
- Дозы, которые были извлечены из изолированного ящика, но не использовались, следует выбросить.
- Дозы следует использовать в течение 2½ сутки после отбора у хряка

