

Symptomer

- Nedsat ædelyst
- Indfaldne øjne, nedstemthed eller utrivelighed
- Diarré ca. 3 - 10 dage efter fravænning (fravænningsdiarré)
- Grålig, cementfarvet diarré (lawsonia)
- Sort tjæreagtig ildelugtende gødning (lawsonia, maveforandringer)
- Grålig slimet, blodtilblandet diarré (dysenteri)
- Blege grise (lawsonia, universel tarmbetændelse, maveforandringer)
- Nedsat tilvækst (maveforandringer)
- Akutte dødsfald (fravænningsdiarré, lawsonia, universel tarmbetændelse, dysenteri)



Fravænningsdiarré

Årsager og behandling

Sygdom	Årsag	Behandling og vaccination
Fravænningsdiarré	Bakterie	Antibiotikabehandling
Universel tarmbetændelse	Ukendt	Behandling kan sjældent nås, da grisen normalt er død inden der ses symptomer
Regional tarmbetændelse	Bakterie	Antibiotikabehandling Vaccination mulig
Dysenteri	Bakterie	Antibiotikabehandling Ved dysenteri bør der saneres
Maveforandringer		Forebyggelse jf. kampagnemateriale
PMWS	Virus	Følgesygdomme kan behandles med antibiotika

Her og nu forebyggelse

- Tilse de raske grise før syge grise
- Tilse så vidt muligt de mindste grise før de store grise
- Behandl syge grise straks du ser dem - hurtig hjælp er dobbelt hjælp
- Flyt grise der har behov for ro, varme, mv. til sygestier
- Rene, udtørrede og opvarmede stalde ved indsættelse af grise
- Brug et infrarødt termometer til at se om gulvtemperaturen er det samme som lufttemperaturen inden indsættelse
- Vaccination om muligt
- Undgå sammenblanding og tilbageførsel af grise
- Gennemgå med din rådgiver om hygiejne og smittebeskyttelse kan forbedres

Læs om forebyggelse på længere sigt i kampagnematerialet.