

Undgå kanylerester

Når kanylen er knækket

Trin 1:

Fjern **straks** resten af kanylen, hvis den er synlig.

Kan kanylen ikke fjernes, skal dyret **straks** mærkes op.

Trin 2:

Kontakt **straks** slagteriets afregningskontor omkring øremærkning.

Trin 3.

Kontakt slagteriets afregningskontor inden levering.

Danish Crown, Afregningskontor,
tel. 89 19 19 20.

Tican, Afregningskontor, tel. 99 19 23 13.

5 gode råd

Anvend kun **sporbare kanyler**.

- kanylerne skal være godkendt af DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut.
- Godkendelsen sker for hver batch.
- Ved køb skal batchnr. fremgå af faktura.
- Kontrollér batchnr. på:

www.danishmeat.dk/view.asp?ID=12620

Brug altid korrekt kanylestørrelse.

Hav altid **ekstra kanyler** ved hånden.

Brug **aldrig bøjede kanyler** - kassér dem!

Drøft **injektionsteknik** og **hygiejne** med dyrlægen.




Korrekt injektionsteknik

Injektionsmetoden afhænger af præparatet og fremgår af etiketten på medicinflasken.

i.m.: intramuskulær
- injektion i muskulaturen.

s.c.: subkutan
- injektion under huden.



Korrekt brug af kanyler

Pattegrise (jerninjektion): 0,8 mm × 10 mm

Smågrise op til 15 kg: 1,1 mm × 25 mm

Slagtesvin: 1,6 mm × 25 mm

Søer og orner: 1,6 mm × 35 mm

Sløve kanyler bør altid kasseres:

Skift kanyler:

- efter hvert kuld i farestalden.
- efter hver 5-10 behandling af smågrise og slagtesvin
- efter 1-2 behandlinger af søer

Rengør altid kanylen efter brug

Lad ikke kanylen sidde i medicinflasken

Anvend kun sporbare kanyler!

Dansk Svineproduktion

