

Sådan undgår du pink eye i kvægbesætningen

Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begrænser smitten.



Best practice for at undgå at få pink eye i besætningen og for at begrænse smitten, hvis sygdommen allerede er til stede:

Reducér risikoen for at få pink eye ind i besætning:

1. Undgå indkøb af dyr
2. Hold et lavt stressniveau
3. Inge syge dyr i kælvningsafdelingen, da det øger risikoen for Mycoplasma udbrud
4. Oprethold god hygiejne, reducé bl.a. forekomst af gødning, gammel mælk, foder og fluelort
5. Rengør og desinficer hyppigt
6. Bekæmp fluer

Når pink eye ses i besætningen begrænser du spredning, ved at:

1. Isolere, diagnosticere og behandle angrebne dyr efter besætningsdyrlægens anvisninger
2. Håndtere angrebne dyr med høj hygiejne, og altid håndtere raske dyr før syge, da pink eye er meget smitsom
3. Indlede fluebekæmpelsesprogram
4. Gøre rent og desinficere hyppigt (fjern gødning, gammel mælk, foder og fluelort)
5. Reducere forekomsten af støv
6. Rulle halm ud, så der ikke spredes støv
7. Oplyse nærmeste naboer om problemet

Yderligere forbehold ved kreatur på græs

1. Undgå arealer hvor der er stive vækster, der kan lave skader på øjnene.
2. Lys kan disponere for Pink eye – sørg for tilstrækkelig med skyggeareal.

Sådan ser det ud >

Sådan ser pink eye ud

De kliniske tegn på pink eye optræder typisk indenfor 2 dage efter infektionen har fundet sted og kan forværres fra øget mængde tåreflåd til svære hornhindsår til brist af hornhinden og blindhed. Sygdommen præsenterer sig i fire stadier:

1. Øget tåreflåd og lysfølsomhed
2. Efter 24-48 timer udvikler der sig betændelse i hornhinden, hvor hornhinden bliver grå, typisk med udgangspunkt fra midten af hornhinden
3. Hornhindsår og fremtrædelse af blodkar i hornhinden, hvorved det karakteristiske Pinkeye fremtræder.
4. Brist af hornhinden

Det væsentligt at handle hurtigt på de indledende kliniske symptomer. Dels fordi sygdommen er meget smitsom og hurtig kan sprede sig i besætningen - dels fordi sygdommen er smertefuld.

STADIE 1



STADIE 2



STADIE 3



STADIE 4



Læs også: Værd at vide om pink eye på www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/eksotiskesmitsommesygdomme/Sider/Pink-eye.aspx