

IPM

SÅDAN TJEKKER DU MARKERNE FOR SEPTORIA

UDFORDRING

Septoria (hvedegråplet) er den vigtigste sygdom i hvede og den svampesygdom, som aksbeskyttelsen oftest er rettet imod. Selv om bekæmpelse af Septoria omkring skridning kaldes "aksbeskyttelse", så har sprøjtningen mod Septoria ikke til hensigt at beskytte akset, men de øverste 2-3 blade.

SÅDAN GØR DU

Den helt afgørende faktor for angreb af Septoria er nedbør. Der er også nogen forskel på sorternes modtagelighed. Sædskifte, såtid, jordbearbejdning og anden dyrkningsteknik spiller kun en minimal rolle for angrebet.

HVAD AFGØR OM MARKEN ANGRIBES AF SEPTORIA?


Behovet for at bekæmpe Septoria og valg af dosering er afhængig af antallet af dage med over 1 mm nedbør fra vækststadium 32 (2. knæ kan mærkes) til vækststadium 71 (afblomstret). I vækststadium 32 er det blad, som senere bliver 3. øverste blad, på vej frem og kan smittes.

Rentabiliteten i at beskytte bladene med svampemiddel er også afhængig af, hvor længe bladene holder sig grønne i juli måned. Visner bladene hurtigt, fordi der f.eks. er tørt, får du mindre for den sidste svampesprøjtning. På sprøjtetidspunktet kender du ikke vejforholdene i juli, og derfor får du i nogle år mindre for den sidste svampesprøjtning end forventet.

LAV ET SEPTORIA-SPRØJTEVINDUE

Der går ca. 3 uger fra Septoria smitter, til der ses symptomer på bladene. Lav dit eget sprøjtevindue, hvor du ikke sprøjter mod svampesygdomme.

- Notér dagligt fra vækststadium 32 (2. knæ udviklet), på hvilke dage der kommer nedbør og hvor meget. Du afgør, om planterne er i vækststadium 32 ved at flække den tykkeste stængel på nogle planter og tælle antallet af knæ.
- Afmærk 2-3 planter med en pind, som du vil følge i sæsonen.
- Noter ned, hvornår du ser Septoria på hver af de øverste tre blade.
- I sprøjtevinduet har du samtidig mulighed for at vurdere smittetrykket og effekten af din sprøjtning.



MODTAGELIGE SORTER

Pt. de fleste af de dyrkede sorter.

Smitte sker ved mindst 4 dage med nedbør fra vækststadium 32.

DELVIS MODTAGELIGE SORTER

Pt. kun mindre dyrkede sorter som Creator. Smitte sker ved mindst 5 dage med nedbør fra vækststadium 37 (fanebladet synligt). Bekæmpelse tidligst i vækststadium 39. (fanebladet fuldt udviklet).

ALLE SORTER

Uanset nedbør udløses en bekæmpelse i vækststadium 45-59 (begyndende skridning til fuld gennemskridning), hvis mere end 10 pct. af planterne har angreb på 3. øverste blad.



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

KONTAKT

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent
SEGES Planter & Miljø
gcn@seges.dk
+45 8740 5439 / +45 2028 2695



SEGES P/S
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk



Planter & Miljø