


Forebyggelse af mavesår hos polte og søer

Maveforandringer

Maveforandringer opstår i mavens hvide del lige efter indmunding af spiserøret. Denne del af maveslimhinden er ikke beskyttet af slim mod de syrer og enzymer som dannes i mavens nederste del. Et tyndtflydende maveindhold gør, at syrer og enzymer kommer i kontakt med den hvide del af maven, mens et tyktflydende (grødagtigt) indhold forhindrer, at dette sker.

Forebyggelse - øg foderstrukturen:

- Juster formalingsgraden så kornet får en grovere struktur.
- Strukturen af kordelen skal være "mellem groft formalet" eller grovere.
- "Mellem groft formalet" svarer til 50 pct. < 1 mm, 35 pct. mellem 1 og 2 mm, 12 pct. mellem 2 og 3 mm og 3 pct. over 3 mm.
- Der må ikke være hele kerner.
- Brug sigteapparat til at kontrollere kornets formalingsgrad.




Bygholmsigte som viser en "mellem groft formalet" kordel

Sammensætning af foder:

- Anvend byg som eneste kornart.
- Reducér energiindholdet i diegivningsblandingen til 105 FEso/100 kg.
- Sørg for adgang til frisk halm.
- Ved brug af pelleteret foder, kan der suppleres med ca. 20 pct. "mellem groft formalet" korn.

I Info Svin er mere detaljeret information inklusiv video under emnet "Mavesår" på www.infosvin.dk

Denne folie findes på engelsk og russisk på www.infosvin.dk



Tegning af maven

O = den hvide del (ubeskyttet),
F = fundusdel (her dannes syrer og enzymer som herfra skyller op på den ubeskyttede del)



Tyndtflydende maveindhold



Tyktflydende maveindhold

