

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skadedyr i markfrø til frøproduktion

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES PlantelInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES PlantelInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Lamdex (396-77) mod skadedyr i markfrø til frøproduktion

### Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Halmen og rester må ikke opfodres.
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Der må i alt kun anvendes 0,6 kg/ha Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.

### Advarsel:

”Se Lamdex etiketten”

## Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Markfrø til frøprodukter	Thrips, jordlopper, bladlus, kornbladbillelarver, bladrandbiller, engrapgræsgalmyg	Max 0,2 kg/ha  I alt max 0,6 kg/ha pr. vækstsår	1-3	Ved konstateret angreb
	Hvedemyg, galmyg, tæger, sommerfuglelarver	Max 0,3 kg/ha  I alt max 0,6 kg/ha pr. vækstsår	1-2	
	Fritfluer, agerugler, <b>aksløberlarver</b>	Max 0,4 kg/ha  I alt max 0,6 kg/ha pr. vækstsår	1	

Sprøjteudstyr: Marksprøjte

Dato: 4. juni 2020 – Opdateret 16. februar 2022 – Opdateret 27. januar 2023