



HVAD?	HVORDAN?	HVORFOR?
Sædskitte	Undgå at dyrke rødsvingel i marker med kvik, ager-rævehale, knæbøjet rævehale, blød hejre, væselhale, rajgræs og andre vanskelige ukrudtsarter.	Ukrudtsgræsserne er vanskelige eller umulige at bekæmpe i frøgræs og giver stort rensesvind. Frarensning af frø af agerrævehale, knæbøjet rævehale, blød hejre, hundegræs, rajgræs, engsvingel og de tokimbladede arter kamille, haremud og skræppe kan være umuligt, eller kan koste et stort rensetab.
	Vårafgrøder i sædskitte.	Vårafgrøder sanerer græsukrudt. De fleste græsarter har begrænset fremspiring om foråret og har ingen eller begrænset frøkast.
Stubhåndtering	Lad stub ligge urørt længst muligt efter høst.	Flest spildfrø og ukrudtsfrø går til ved spiring, angreb af svampe eller bliver ædt, når de længst muligt ligger urørt i stubben om efteråret. Hvis frøene nedbringes ved stubbearbejdning, vil mange af frøene bevare spireevnen. Ønskes behandling af stubben, bør det kun være overfladisk strigling.
Pløjning	Afsæt passende kort stub og sørg for en jævn fordeling af evt. snittet halm og avner. Indstil ploven omhyggeligt, så spildkorn og ukrudtsfrø lægges ned i bunden af furen.	Ved pløjning får spildkorn og nye ukrudtsfrø ikke spiremulighed. Frø af græsser mister forholdsvis hurtigt spireevnen, når de ligger i jorden. Et enkelt år på furebunden giver derfor et stort henfald af frø.
Spredning af græsukrudt	Forebyg spredning af græsukrudt med høstredskaber.	Græsser spredes let med høstmaskinerne. Især væselhale spredes let, fordi dens frø med stak hænger fast i soldene. Gør derfor mejetærskeren så ren som mulig ved skifte mellem marker/ejendomme. Halmpressere skal være rengjorte og uden balle i kammeret, når de kører ind på arealer med frøavl.
Såbed	Etabler et godt, jævnt og ensartet såbed.	Et ensartet såbed uden knolde sikrer en ensartet sådybde og fremspiring, så der ikke opstår 'huller' med plads til ukrudt.
Udlægsmetode	Udlæg rødsvingel i vintersæd.	Rødsvingel vokser langsomt. Udlæg i vintersæd giver tid til, at afgrøden kan udvikle sig og giver samtidig bedre konkurrence mod ukrudt. Der er begrænsede muligheder for at bekæmpe græsukrudt i dækafgrøden. Det er vigtigt at minimere spild ved høst af dæksæd.
	Udlæg rødsvingel i ærter.	Rødsvingelsorter med udløbere kan lægges ud om foråret i ærter.
	Udlæg rødsvingel i vårsæd.	Rødsvingelsorter med udløbere kan også lægges ud om foråret i vårsæd. Etableringen kan optimeres ved at så både korn og frø med dobbelt rækkeafstand.
Ukrudtsbekæmpelse i udlæg i vintersæd	Bekæmp ukrudt når sprøjtesporene er synlige. Anvend midler, som er skånsomme over for rødsvingeludlægget.	Rødsvingeludlægget tåler DFF, Oxitril/Briotril og Express. Undgå at anvende Stomp og Boxer. Hvis der er behov for at bekæmpe græsukrudt, er Stomp mest skånsomt.
	Vurder tidligt forår behovet for opfølgende ukrudtsbekæmpelse.	Udlægget tåler de fleste midler mod tokimbladet ukrudt, men ikke alle, så tjek altid vejledninger. Græsser kan bekæmpes med Hussar, Primera Super/Foxtrot eller Topik.
Ukrudtsbekæmpelse i udlæg i vårafgrøder	Bekæmp ukrudtet effektivt med midler, som er skånsomme over for udlægget.	I ærter kan Fighter 480 + Stomp anvendes. I vårkorn er de fleste midler mod tokimbladet ukrudt skånsomme over for udlæg. Tjek vejledninger.

HVAD?	HVORDAN?	HVORFOR?	
Ukrudtsbekæmpelse efterår efter høst af dæksæd	Vurder om der er behov for at bekæmpe tokimbladet ukrudt, græsser eller spildkorn.	I august-september, efter høst af dæksæd, er der mulighed for at bekæmpe ukrudt og spildkorn, som er spiret frem før eller efter høst af dæksæd.	
	Vurder om der er behov for at bekæmpe væselhale med Reglone.	Væselhale kan bekæmpes med Reglone i vinterperioden, hvor afgrøden er ude af vækst. Reglone skader rødsvingel, så det er en nødløsning i pletter og kun i 2. års marker.	
	Gå marken igennem ved begyndende vækst i foråret og vurder behovet for forårsopfølgning mod ukrudt.	Ukrudtsbekæmpelsen i foråret bør ske ud fra observationer i marken. Enårig rapgræs i større mængder kan genere afgrøden og føre til øget frarensning. Optræder der kvik, skal det bekæmpes.	
	Fastlæg middelvalg og den nødvendige dosis mod tokimbladet ukrudt med Planteværn Online, effektivtabelle eller anden viden om midlernes stærke og svage sider.	Planteværn Online, effektivtabelle og behovsbestemte anbefalinger er hjælpeværktøjer til at målrette ukrudtsbekæmpelsen i forhold til middel og nødvendig dosering.	
	Ukrudtsbekæmpelse i frøavlsåret	Udfør ukrudtsbekæmpelsen under optimale vejrforhold.	Flere af midlerne til forårsbrug har høje temperaturkrav for optimal virkning. En morgensprøjtning med efterfølgende høj temperatur vil give den bedste effekt og mulighed for lavest mulig dosis.
	Afsæt et usprøjtet område.	I et mindre sprøjtevindue kan effekten af behandlingerne på ukrudt og afgrøde vurderes senere i sæsonen. Undlad høst såfremt der er fremmede græsser.	
	Etabler en barjordsstribe eller afslået rand omkring marken.	Fremmede græsser optræder oftest i kanten af marken.	
Vækstregulering	Hold en god køredisciplin og undgå tung trafik.	Undgå at køre i marken, når der er risiko for at skade græsset, så der opstår bare pletter og dermed plads til ukrudtet. Især væselhale optræder, hvor der opstår bare pletter. Undgå tung trafik i udlægsmarken. Hold kornvogne i forlandet.	
	Vækstreguler under strækningen i afgrøder med god vandforsyning.	Det er afgørende for udbyttet, at afgrøden er stående i blomstringsfasen. Specielt i marker med stort udbyttepotentiale, der måske er gødet udover normen, er vækstregulering afgørende for udbyttet.	
Sygdomme	Afsæt et usprøjtet område.	I et sprøjtevindue kan effekten af behandlingen vurderes.	
	Normalt optræder svampe ikke i et omfang, der udløser bekæmpelse - men hold øje med meldug og rust.	Rødsvingel kan angribes af meldug og rust, samt til tider bladpletsvampe. Kun ved mere udbredte angreb af meldug eller rust er bekæmpelse aktuel.	
Skadedyr	Afsæt et usprøjtet område.	Et usprøjtet vindue giver mulighed for at vurdere effekten af en behandling.	
	Der er normalt ikke behov for at bekæmpe skadedyr i rødsvingel.	Bladlus kan forekomme i juni-juli, men bekæmpelse er sjældent rentabelt. Løvsnudebillens larver optræder i visse år, især på lettere jord. Æggene lægges i maj-juni, men skaden opdages først fra august, hvor græsset visner i områder af marken. Der er ingen bekæmpelsesmuligheder.	
Ukrudtskort før høst	Opdater ukrudtskort.	Gå marken igennem og noter på markkort, i lommebog el. lign, hvis der er ukrudtsarter, som ikke er bekæmpet tilfredsstillende eller er nye på arealet. Kortlæg især græsser, så der kan saneres mod disse inden næste frøafgrøde i marken.	

## KONTAKT

Poul Henning Petersen, landskonsulent  
 SEGES Planter & Miljø  
 php@seges.dk  
 +45 8740 5443 / +45 2010 2297

