

10-punktsplan for håndtering af skuldarsår

Forebyggelse

1. Huldvurdering i hele cyklus er afgørende.
2. Individuel fodring af søer - også i drægtighedsstalden.
3. Risikosøer indsættes på måtte og efterses dagligt for skuldarsår på begge sider, dvs:
 - Søer i dårligt huld (huld 1 og 2)
 - Søer, der tidligere har haft skuldarsår
 - Søer med besværet gang eller sygdom
 - Gamle søer
4. Fast, skridsikkert gulv under søerne i farestalden.
5. Justering af fareboksen - yderste position ved indsættelse og igen 1-2 dage efter faring.

Behandling

6. Aflastning med måtte allerede ved rødme på skulderpartiet.
 - Ved sår anvendes antibiotikaspray
 - Hvis såret forværres til grad 3, fravænnenes soen og sættes i sygesti med et tykt lag halm

Andre tiltag

7. Notér på sokortet, når soen har skuldarsår og på hvilken side.
8. Søer med grad 3 skal altid være i en sygesti. Grad 4 betragtes som misrøgt og må ikke forekomme i besætningen.

Levering

9. Se nærmere på de søer, der har et ar på skulderen eller som du mener, har haft skuldarsår før. Disse søer må undersøges nærmere inden de leveres.
10. En grad 4 leveret på slagteriet vil blive politianmeldt. Hvis du ser og mærker følgende inden leveringen, er der stor risiko for, at soen har haft grad 3 eller 4:
 - En stor fast hævelse (mere end 5 cm i diameter)
 - Huden på skulderpartiet kan ikke forskydes



Fotos af grad 1:

Allerede ved rødmen af huden skal soen sikres et blødt underlag. Mærk efter hvordan "såret" udvikler sig - drøft med din dyrlæge, hvordan du gør. Opstår der store faste hævelser eller hud, som ikke kan forskydes, er der formentlig tale om en højgradig læsion. Sådanne dyr skal aflives. Foto: Dansk Svineproduktion.

Øvrige materialer: læs mere om håndtering af skuldarsår i Dansk Svineproduktions skuldarsårmanual på www.infosvin.dk