

Bovaer til kvier

Frederikke Hahn Stahlschmidt, Marie
Rønn, Nicolaj Ingemann Nielsen & Marie
Laurup Petersen

SEGES Innovation

Fodringsdag, Herning, 1. september 2026

Projekt: OpMet
Finansieret af BUP

Agenda



Niveau af metan fra ungdyr internationalt



Effekt af Bovaer i litteraturen




Effekt på foderoptagelse ved fodring med Bovaer



Effekt på metan ved fodring med Bovaer

Niveau af metan fra kødkvægsstude internationalt og effekt af Bovaer



Afprøvninger


- 3 afprøvninger i 3 besætninger
- 1 kontrol- og 1 Bovaer-periode per afprøvning
- Kvier i forskellige aldre og drægtighedsstadier
- Holstein & Jersey-besætninger
- 60 mg 3NOP/kg TS



Foreløbige resultater – Effekt på foderoptagelse


Foderoptagelse, kg TS/kvie/dag	A	B	C
Kontrol	7,2	9,0	6,7
Bovaer	8,2	11,8	7,5

Foreløbige resultater – Effekt på metan i relation til foderoptagelse



Konklusioner

- Foreløbige resultater viser
 - Ingen negativ effekt på foderoptagelsen
 - Reduktion af g metan/kg TS



TAK til forsøgsværter og TAK for opmærksomheden

Frederikke Hahn Stahlschmidt
FHLJ@seges.dk

Marie Rønn
MARR@seges.dk