

10 - punktsplan for håndtering af halebid

Årsagerne til halebid kan være mange, og ofte er der flere årsager, der ligger til grund for problemet. Årsagerne kan ofte findes i grisenes nærmiljø.

Forebyggelse:

1. Undgå overbelægning.
2. Før logbog over problemet. Noter årstid og klimaskift, foderskift og sygdomsproblemer.
3. Indret stien efter grisenes behov med gøde-, aktivitets- og lejeområde og tilstrækkelige æde-/drikkepladser.
4. Oprethold et optimalt klima i stierne, herunder passende temperatur og god luftkvalitet. Undgå træk og gylleventilation.
5. Tjek grisenes adgang til ressourcer, herunder foder, vand og beskæftigelses- og rodemateriale.
6. Minimer sammenblandingen af grise.
7. Overvej andre årsager som for eksempel statisk elektricitet, krybe strøm eller meget støj i stalden.

Akut behandling:

8. Find den gris i stien, der bider hale og flyt den i en sti for sig. Det er oftest mindre og rastløse grise, der bider hale.
9. Isolér de halebidte grise i en sygesti og behandl dem. Grise med lammelser i bagparten skal aflives med det samme. Grise, der stadig efter tre dage i en sygesti er utrivelige, har ledbetændelse eller andre sygdomme skal aflives.
10. Tildel rigeligt med beskæftigelses- og rodemateriale i en periode for at beskæftige grisene.



Er temperatur og luftfugtighed i stalden indstillet korrekt? Tjek styringen af ventilationsanlægget.

Husk at:

Ønsket stald-temperatur + ønsket luftfugtighed = / < 90



Tildel mere beskæftigelses- og rodemateriale eller suppler med en anden type under et halebidsudbrud.



Kontroller vandventilens ydelse ved brug af ur og målebæger.

Ydelse:

Smågrise: 0,5-0,8 L/min

Slagtesvin: 0,8-1,2 L/min

Læs mere: Manual om halebid på www.infosvin.dk - Transportegnethed og halebid. www.infosvin.dk