



Beskyt din **kødkvægs**besætning mod

SALMONELLA DUBLIN

Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i besætningen eller ved slagtning. Forekomst af Salmonella Dublin i kødkvægsbesætninger vurderes at være under 1,0 %.

Undgå smitte mellem besætninger

Spredning af smitte fra én besætning til en anden sker hovedsageligt via kreaturer eller maskiner. Det bedste du kan gøre for at undgå smitte mellem besætninger er derfor:

- Begræns køb og salg af dyr
- Køb udelukkende niveau 1-kreaturer ved indkøb og få gerne indsiget i besætningens historiske tankmælksprøver for salmonella, kalvedødelighed og eventuelle blodprøveresultater på enkelt dyr, inklusive de indkøbte
- Undgå at bringe smitten videre til andre besætninger med snavsede støvler, kreaturvogne, maskiner, gyllevogne etc.
- Har du selv besøgt en anden besætning, så skift tøj og fodtøj, før du går ind i din egen stald
- Udlevering af dyr til slagtning eller levedrug bør foregå fra udleveringsrum.

Undgå smitte i besætningen

Smitten spredes især i stalde med dårlig hygiejne, høj belægning og sammenblanding af dyr. Det bedste du kan gøre for at forhindre smittespredning er derfor:

- Hold stalden ren
- Omkring kælvning og ved høj belægningsgrad er det vigtigt at holde god hygiejne og være opmærksom på syge dyr
- Hold køer og småkalve adskilt fra ungkreaturer

- Benyt holddrift, når kreaturerne flyttes til nye staldafsnit eller bokse
- Flyt kun dyr til rengjort og desinficeret boks
- Hav styr på hygiejnen: Hold fodringstrug og vandkar rene. Færdsel på fodergangen må kun foregå i renvaskede støvler
- Hold bokse velstrøede
- Hold dyrene isolerede ved tegn på sygdom som diarré og lungebetændelse, da syge dyr udskiller mange bakterier.

Læg en handlingsplan

Hvis din besætning er smittet med Salmonella Dublin, er det vigtigt, at du får lavet en handlingsplan, så besætningen bliver fri for sygdommen. Din praktiserende dyrlæge kan hjælpe med at udarbejde handlingsplanen, så den tager udgangspunkt i netop din besætning.

Symptomer og smitte

Udbrud af Salmonella Dublin viser sig oftest hos kalve fra to uger til seks måneder samt hos nykælvare. Men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Symptomerne er feber, diarré, lungebetændelse, aborter samt akutte dødsfald hos de syge dyr. Syge dyr udskiller store mængder bakterier med gødningen, og en klat svarende til en teskefuld kan være nok til at smitte et andet kreatur. Smitten kan gemme sig i organisk materiale, som for eksempel gødning og gylle, hvor den kan overleve i flere år.

Læs mere om niveautildeling, sanering og Salmonella Dublin på www.salmonella.dk

➔ Se eksempler på smitteveje, på bagsiden

