


Malkning

Malk koen fra i en separat spand. Anvend høj hygiejne (handsker og rent yver), og husk pattedyb.

VIGTIGT – Bland ikke mælken med celletals- eller penicillinmælk!



● **SE MERE** på bagsiden af pjecen.

Opbevaring

Opbevar din overgangsmælk i rene spande/ kassetter eller separat køletank og nedkøl/nedfrys hurtigt efter malkning. Hav gerne mælken i spande/bøtter med maks. 10 liters kapacitet, for hurtig nedkøling.

Overgangsmælken kan også udfodres med det samme efter malkning. Vær dog opmærksom på tiden, så ophobning af bakterier ikke sker.



● **SE MERE** på bagsiden af pjecen.

Spand: Notér udmalkningsdato på spanden. Brug altid den ældste først (maks to dage i køleskab)



Er besætningen smittet med salmonella eller mycoplasma: Overgangsmælken varmebehandles ved 60 °C i 60 minutter inden nedkøling/nedfrysning.

VIGTIGT – Lad ikke temperaturen komme over 60 °C, da antistofferne ødelægges.




Fodring – et eksempel

KALVE FRA 1-4 DAGE

Giv gerne ren overgangsmælk de første 4 dage og herefter 0,5-1 liter pr. fodring, indtil kalven er 14 dage gammel.

● **Se mere** i på bagsiden af pjecen.



Har du nok overgangsmælk, giv da gerne kalve ren overgangsmælk op til 7 dage.

KALVE FRA 4-14 DAGE

Mælkeerstatning: Bland mælkepulver og tilføj overgangsmælk svarende til 0,5-1 liter pr. kalv pr. fodring

Sødmælk: Bland 0,5-1 liter overgangsmælk pr. kalv pr. fodring i mælketaxi, og tilføj den mængde sødmælk, der skal bruges til denne fodring.

