

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Betanal (18-528) mod ukrudt i Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Calendula officinalis, Chrysanthemum carinatum, Papaver rhoeas, Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis, Malva og Convolvulus tricolor til frøproduktion

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES PlanteInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES PlanteInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mod ukrudt i Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Calendula officinalis, Chrysanthemum carinatum, Papaver rhoeas, Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis, Malva og Convolvulus tricolor til frøproduktion

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Calendula officinalis, Chrysanthemum carinatum, Papaver rhoeas, Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis, Malva og Convolvulus tricolor til frøproduktion
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Betanal etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt
Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Calendula officinalis, Chrysanthemum carinatum,	Visse bredbladede ukrudtsarter. Se etiketten.	1,5 L/ha	1 Eller Splitbehandling: 2x 0,75 L/ha (2-3 dage)	på ukrudtets kimbladstadiet
Papaver rhoeas og Convolvulus tricolor		0,75 L/ha	1	
Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis, Malva		1,0 L/ha	1	

Doseringerne skal altid tilpasses afgrødens udviklingstrin. Stressede afgrøder bør ikke behandles.

Sprøjteteknik: Bomsprøjte/marksprøjte

Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 16. februar 2021