

KLØVERANDEL

Visuel bedømmelse i slætmarken: rød- og hvidkløverblandinger

VEJLEDNING




Hæftet er vejrbestandigt og tages med i slætmarken til bedømmelse af kløverandel inden slæt.

Hæftet er inddelt efter slættidspunkt: 1. slæt, maj-juni og 2. slæt, juni-juli (forside) samt 3. slæt, juli-sept. og 4.-5. slæt, sept.-okt. (bagside). For hvert slættidspunkt findes en palette af sider inddelt i intervaller med forskellig kløverandel. For hvert interval er der et antal fotos, som sammenholdes med det, du ser i marken.


Når du har fundet det foto, der ligner det, du ser i marken, finder du på fotoet andelen af kløver af en samlet prøve, og du får herved et bud på kløverandelen i din mark. Vær opmærksom på, at der kan være tale om forskellige græsblandinger, slætstrategier og varighed siden sidste slæt på fotos.

Kløverandelen er bestemt ved botanisk analyse med tørring og vejning. Ikke alle sider er komplette, og værktøjet kan suppleres med yderligere fotos.

4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel >80 procent




TIDLIGT FORÅR (april). Kløverandel 0-20 procent



4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 70-80 procent





TIDLIGT FORÅR (april). Kløverandel 20-30 procent





4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 60-70 procent






TIDLIGT FORÅR (april). Kløverandel >30 procent



4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 50-60 procent




1. SLÆT (maj, juni). Kløverandel 0-10 procent



4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 40-50 procent




1. SLÆT (maj, juni). Kløverandel 10-20 procent






4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 30-40 procent



1. SLÆT (maj, juni). Kløverandel 20-30 procent





4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 20-30 procent






1. SLÆT (maj, juni). Kløverandel 30-40 procent




4. og 5. SLÆT (sept., okt.). Kløverandel 10-20 procent






1. SLÆT (maj, juni). Kløverandel 40-50 procent




3. SLÆT (juli, sept.). Kløverandel 80-90 procent





1. SLÆT (maj, juni). Kløverandel >50 procent



3. SLÆT (juli, sept.). Kløverandel 70-80 procent





2. SLÆT (juni, juli). Kløverandel 20-30 procent





3. SLÆT (juli-sept.). Kløverandel 60-70 procent



2. SLÆT (juni, juli). Kløverandel 30-40 procent




3. SLÆT (juli-sept.). Kløverandel 50-60 procent




2. SLÆT (juni, juli). Kløverandel 50-60 procent



3. SLÆT (juli-sept.). Kløverandel 30-40 procent






2. SLÆT (juni, juli). Kløverandel 60-70 procent



3. SLÆT (juli-sept.). Kløverandel 20-30 procent



2. SLÆT (juni, juli). Kløverandel 70-80 procent



3. SLÆT (juli-sept.). Kløverandel 0-20 procent

