

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Boxer (1-211) som jordmiddel mod ukrudt i Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Iberis spp., Centaurea cyanus, Convolvulus spp., Gypsophila elegans, Chrysanthemum Segetum, Cynoglossum, Lupin og Nigella til frøproduktion**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlanteInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Boxer som jordmiddel mod ukrudt i *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Iberis* spp., *Centaurea cyanus*, *Convolvulus* spp., *Gypsophila elegans*, *Chrysanthemum Segetum*, *Cynoglossum*, *Lupin* og *Nigella* til frøproduktion

## Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Iberis* spp., *Centaurea cyanus*, *Convolvulus* spp., *Gypsophila elegans*, *Chrysanthemum Segetum*, *Cynoglossum*, *Lupin* og *Nigella* til frøproduktion
- Halmen og rester må ikke anvendes til opfodring
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 10 m til vandmiljøet (søer, vandløb, mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand

## Advarsel:

”Se Boxer etiketten

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlingstidspunkt
<i>Chrysanthemum carinatum</i> , <i>Calendula officinalis</i> , <i>Iberis sempevirens</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Gypsophila elegans</i>	Græs- og bredbladet ukrudt	2,5 L/ha	1	Efter såning og før fremspiring
<i>Chrysanthemum Segetum</i> , <i>Convolvulus</i> spp., <i>Cynoglossum</i> , <i>Iberis</i> spp., <i>Lupin</i> og <i>Nigella</i>		1,0 L/ha		

*Sprøjteudstyr*: Marksprøjte/bomsprøjte

Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

*Dato*: 16. februar 2021