

Brugsanvisning til mindre anvendelse af nedenstående metamitron-holdige midler mod ukrudt i beder, timian, skorzoner, spinat og persille til frøavl på friland

Goltix SC 700 (396-22) og Metafol 700 SE (1046-12)
~~ECP Metafol 700 (501-30), SweDane Metafol 700 (501-41), Metafol 700 (501-42) og Target 700 (501-27)~~

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Da SEGES P/S Plante og Miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES P/S Plante og Miljø ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Goltix SC 700 (396-22) og Metafol 700 SE (1046-12) ECP Metafol 700 (501-30), SweDane Metafol 700 (501-41), Metafol 700 (501-42) og Target 700 (501-27) mod ukrudt i beder, timian, skorzoner, spinat og persille til frøavl på friland

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i beder, timian, skorzoner, spinat og persille til frøavl
- Planter og rester må ikke opfodres
- Som bladmiddel: Max 1 L/ha per behandling og 3 L/ha per vækstår fordelt på max 4 behandlinger pr. vækstår
- Som jordmiddel: Max 1 L/ha per vækstår ved max 1 behandling per vækstår.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter
- For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder metamitron, kun anvendes hvert 3. år på samme areal.

Advarsel:

”Se Goltix SC 700 og Metafol 700 SE (1046-12) ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og Target 700 etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Goltix SC 700 og Metafol 700 SE (1046-12), ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og Target 700 mod ukrudt i beder, timian, skorzoner, spinat og persille til frøavl på friland

Som bladmiddel:

Afgrøde	Skadegører	a) Max. dosering pr. behandling b) Max. dosering pr. år	Antal behandlinger pr. år	Sprøjtetidspunkt
Beder	Bredbladet ukrudt	a) 0,5-1,0 L/ha b) 3 L/ha	Max. 4	Ukrudtet er på kimbladstadiet. Fugtig jord fremmer effekten. April – juni.
Timian	Bredbladet ukrudt	a) Udlægsåret: 0,5 L/ha Behandling kan gentages med 0,5 L/ha Frøavlsårene: 1,0 L/ha b) 3 L/ha	Max. 4	Afgrødens kimbladsstadiet. Ved begyndende vækst. Fugtig jord fremmer effekten. April – juni.
Skorzoner	Bredbladet ukrudt	a) 0,5-1,0 L/ha b) 3 L/ha	Max. 4	Efter fremspiring når skorzonerens første blivende blade er 4-8 cm lange. Fugtig jord fremmer effekten. April – juni.

Som jordmiddel:

Afgrøde	Skadegører	Max. dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. år	Sprøjtetidspunkt
Spinat	Bredbladet ukrudt	1,0 L/ha Kan evt. blandes med Command CS.	Max. 1, da afgrøden derefter vil være fremspiret	Umiddelbart efter såning. Fugtig jord fremmer effekten April – juni.
Persille	Bredbladet ukrudt	0,5-1,0 L/ha	Max. 1, da afgrøden derefter vil være fremspiret.	Umiddelbart efter såning og før fremspiring. Fugtig jord fremmer effekten. April – juni.

Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

24. marts 2017

Opdateret 9. februar 2026

Opdateret 6. juli 2026