

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Proline EC 250 (18-473) mod Cercospora-bladplet i sukkerroer

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. NBR Nordic Beet Research kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Proline EC 250 (18-473) mod Cercospora-bladplet i sukkerroer

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod Cercospora-bladplet i sukkerroer
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere BBCH 49
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Ved manuel bortlugning af stokløbere i behandlede sukkerroer skal der anvendes arbejdstøj. Kemisk bestandige handsker skal anvendes i 53 døgn efter sprøjtning

Advarsel:

”Se Proline EC 250 etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtfrist/ PHI
Sukkerroer	Cercospora-bladplet	0,5 L/ha	150-400 L/h	2 (min. 21 dage)	BBCH 40-49 juli- oktober	BBCH 49

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte med sprøjtebom.

Behandlingstidspunkt: Sukkerroer behandles ved de første symptomer på bladsygdommen Cercospora-bladplet (i vækststadiet BBCH 40-49).

Dato: 30. juni 2025