BESKYT HONNING MOD **CLOPYRALID**

REV. MAR 2022

FOTO: POUL HENNING PETERSEN, SEGES

UDFORDRING

BIAVLERNE FINDER FORTSAT SMÅ, MEN MÅLBARE SPOR AF CLOPYRALID I HONNING. GRÆNSEVÆRDIEN ER LIG MED DETEKTIONSGRÆNSEN, OG DET BETYDER I PRAKSIS, AT HONNING MED FUND OVER TO GANGE DETEKTIONSGRÆNSEN IKKE KAN SÆLGES.

SÅDAN GØR DU

Bekæmp om muligt kamille med Belkar om efteråret. En tæt og veletableret afgrøde har god konkurrenceevne over for kamille. Vurder derfor nøje behovet for bekæmpelse om foråret. Kan sprøjtning helt undværes, eller er det tilstrækkeligt med en randsprøjtning eller evt. en pletsprøjtning i områder med lavt plantetal?

Udfør sprøjtning mod kamiller om foråret i vinterraps så tidligt som muligt. Clopyralid er systemisk og således bevægelig i planternes saftstrøm. Det formodes, at koncentrationen i pollen og nektar vil være stigende med senere sprøjtetidspunkt.

Galera skal anvendes senest i vækststadie 50 og afgrøden må ikke være stresset af næringsstofmangel, vandlidende jord, skadedyr, nattefrost mv. Galera har i forhold til Matrigon 72 SG og Cliophar 600 SL en bedre og mere sikker effekt mod kamille. Korvetto anvendes også senest i vækststadie 50 og har bl.a. effekt mod kamille, valmue og storkenæb.

Vær opmærksom på sprøjtefristen for Matrigon og Cliophar. Det er for sent at sprøjte, når de første blomsterknopper er synligt gule.

VIS HENSYN

Hold afstand til bistader. Vi kender ikke den præcise spredningsvej for clopyralid til honning, men det er godt landmandskab at holde nærområdet omkring bistaderne fri for clopyralid og andre plantebeskyttelsesmidler.

KONTAKT
Jens Erik Jensen, landskonsulent
SEGES
jnj@seges.dk
+45 2171 7706

KONTAKT
Poul Henning Petersen, landskonsulent
SEGES
php@seges.dk
+45 2010 2297

FOTO: POUL HENNING PETERSEN, SEGES

Sprøjtefristen for Matrigon 72 SG og Cliophar 600 SL er stadie 55, hvor blomsteranlæg på hovedskud er synlige men lukkede og uden synlige gule kronblade.

FOTO: DOW AGROSCIENCES

Dunke med Matrigon gør tydeligt opmærksom på sprøjtefristen.

FOTO: POUL HENNING PETERSEN, SEGES

Vækststadie 50 er sidste frist for sprøjtning med Galera og Korvetto. Knopperne er stadig dækket af de nye blade.

FOTO: TORKILD BIRKMOSE, SEGES

Tidligst mulig sprøjtning giver mindst risiko for clopyralid i nektar.

Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES Innovation P/S
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

SEGES INNOVATION