

Udfordring

Pærebladloppen er et sugende insekt med stor opformeringsevne og flere generationer årligt. Den bliver især et problem, når de naturlige fjender i plantagen ikke trives, som det er f.eks. er tilfældet, hvis man sprøjter med bredtvirkende insekticider.

Pærebladloppen suger på skud og frugter, og efterlader sig et spor af honningdug og sodsvamp. For at få en pæn frugt, er man nødt til at holde pærebladlopperne på et minimum.



Sådan gør du



1. Brug feromonforvirring

Brug feromonforvirring mod viklere frem for at sprøjte med bredtvirkende insekticider, som dræber nyttedyr som næbtæger og ørentvister. Nyttedyrene er meget vigtige for at holde bestanden af lopper nede, så derfor må de ikke sprøjtes væk!

Feromoner er de duftstoffer, som hunviklerne udsender, så hannerne kan finde dem. Ved at hænge feromondispensere op i plantagen, sørger man for, at hannerne ikke kan finde hunnerne.



2. Sørg for højt græs

De naturlige fjender skal plejes. Sørg for, at græsset har lidt højde. Det er fint, hvis der er lidt kløver i græsset.



3. Udsæt naturlige fjender

Ved et middelkraftigt angreb af bladlopper har det god effekt at sætte næbtæger ud. Desværre er succesen meget afhængig af bl.a. vejret, og næbtægerne kan ikke klare opgaven, hvis der er rigtigt mange pærebladlopper.



4. Opsæt ørentvisterbo

Lav bosteder til naturlige fjender, som ørentvister. Opsæt et ørentvisterbo i ca. hvert 8. træ. Her trives ørentvister, og forhåbentlig vil bestanden opformeres, så de kan spise en masse pærebladlopper.

Du laver nemt et ørentvisterbo ved at fylde en pottese med halm, clipse den sammen og sætte en elastik eller et bånd i posen, så den kan hænges op i træet.



5. Brug et skånsomt middel

Bliver det rigtigt slemt med pærebladlopper, er det muligt at bekæmpe dem med midlet Movento, som tilsyneladende ikke tager nyttedyrene. Erfaringerne med midlet i 2012 har foreløbigt været rigtig gode.