

Sikker malkning – undgå medicinrester i mælken

Medicinrester i mælk forebygges gennem gode rutiner og en plan om mærkning, registrering og framalkning af behandlede køer

1. Mærkning



Køerne skal mærkes før behandling:

- Viser en ko tegn på sygdom, skal den altid afmærkes
- Afmærk altid behandlede goldkøer

Sæt altid bånd på begge bagben:

- Et bånd kan falde af
- Et enkelt bånd kan overses under malkning

I AMS-besætninger skal køen mærkes med synligt bånd på halen.

Giv dyrlægen besked om koens nummer og placering i stalden. Kun mærkede køer må behandles

2. Registrering



Ved behandling skal al medicin registreres:

- Arkivér tilbageholdelsessedlerne systematisk
- Opdatér lægemiddeljournalen efter hver behandling

Gør det synligt for alle, at køen er i behandling og ikke må malkes med.



Ved ændringer skal tavlen straks opdateres.

Ved AMS eller PC Managementprogram:

- Indtast framalkning, så snart det besluttes, at en ko skal undersøges
- Indtast korrekt tilbageholdelsestid for dyr, der behandles med medicin

Uheld skyldes ofte misforståelser

3. Framalkning



Den bedste metode til framalkning er i separat spand med separat malkesæt og pulsator.

Vakuumsforsyningen til spanden skal altid kobles til pulsatorledningen (aldrig mælkeledningen).

Framalkning i separat spand uden separat malkesæt og pulsator kræver stor omhu, hvis man skal undgå forurening af mælken.

Vakuumsforsyning til spanden tilkobles pulsatorledningen (aldrig mælkeledningen).

Rengør malkesæt, mælkeslanger og andet udstyr, der har kontakt med mælken, i varmt vand inden fortsat brug.

Hvis uheldet er ude:

- Kontakt dit mejeri
- Indvejning skal undgås. Opsæt et synligt STOP-skilt på tanken
- Bortskaf kasseret mælk korrekt
- Vask tanken før ibrugtagning