

# Man ser ikke brunsterne – kører

Anvendes nogen form for teknologi til brunstobservation?



→ Gå til **afsnit 1**



→ Gå til **afsnit 2**

## Afsnit 1

> Fokuspunkt	> Forslag	> Egne notater	Faktablad
Hvor mange personer observerer?	1,2,3,4,5, flere		F 1
Hvor mange gange observeres dagligt?	1,2,3,4,5, flere		
Hvor lang tid bruges/observation/gang, min.?	5, 10, 15, 20, 25, 30, mere		
Hvilke tidspunkter på døgnet observeres der?	Tidspunkter		
Hvilke andre arbejdsopgaver udføres samtidig med observation?	Beskriv		
Hvordan føres notater over observationer?	Beskriv		
Hvordan videregives information til andre observatører?	Beskriv		
Hvor mange brunsttegn skal ses før inseminering?	1,2,3,4,5, flere		
Hvilke brunsttegn udløser inseminering?	Beskriv		

## Afsnit 2

> Fokuspunkt	> Forslag	> Egne notater	Faktablad
Hvilken teknologi anvendes?	Beskriv		F 2
Hvem tjekker alarmlister?	Navn		
Hvornår tjekkes alarmlister?	Tidspunkt		
Hvad er systemets anbefaling for interval mellem topaktivitet og inseminering?	Beskriv		
Insemineres der i overensstemmelse med systemets anbefalinger?	Beskriv		
Ved aktivitetsmåler – hvor stor en del af kørerne registreres for aktivitet?	Procentsats		
Anvendes teknologi i kombination med visuel observation? Hvis ja – gennemgå også afsnit 1	Ja / nej		

Se de nævnte *Faktablade* for uddybende forklaring og løsningsforslag.

# Køerne viser ikke brunst

> Fokuspunkt	> Forslag	> Egne notater	Faktablad
<b>Staldforhold</b>			
Er lysforholdene optimale?	Ja / nej		F 3
Er gulvene skridsikre?	Ja / nej		F 4
Kronisk stress	Hvor høj er belægningsgraden (100 pct.: antal køer = antal sengebåse)?		F 5
	Klimastyring (luftskifte, overbrusning, ventilation)?		
<b>Avl</b>			
Besætningens genetiske afvigelse fra racens gns. for frugtbarhed?	+ / - indekseheder		F 6
<b>Ernæring</b>			
Højt produktionsniveau 0-12 uger efter kælvning	Andel 1.kalvs, 2.kalvs og øvrige køer med særlig høj ydelse (afhænger af lakt.nr. og bes. ydelsesniveau)		F 7
Huldtab i de første 3-4 uger af laktationen	Andel køer med huldtab $\geq 1,0$		F 8
Ketose	Tilfælde/100 årskøer		
<b>Sundhed</b>			
Udeblivende brunst og Cyster	Tilfælde/100 årskøer		F 13
Vanskelig kælvning	Tilfælde/100 årskøer		F 12
Tilbageholdt efterbyrd	Tilfælde/100 årskøer		F10
Tidlig børbetændelse	Tilfælde/100 årskøer		
Abort	Tilfælde/100 årskøer		F 11
Klov- / lemmelidelser	Andel køer med halthedscore 2, 3, 4, 5		F 9

Se de nævnte *Faktablade* for uddybende forklaring og løsningsforslag.