

# **Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning i brug af Goliath/Goltix SC 700 i Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas som jordmiddel**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til  
Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af  
plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

## **Ansvar for vejledning til mindre anvendelse**

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

## **Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar**

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

# Vejledning for Goliath/Goltix SC 700 til mindre anvendelse i Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas som jordmiddel

## Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter for vandmiljøet (søer, vandløb, mv.) for at beskytte organismer der lever i vand.
- Hvis et behandlet areal må ompløjes kan der såes bederoer. Efter pløjning tillige kartofler, majs eller hestebønner
- Goliath/Goltix 700 må kun anvendes en gang pr. vækstsæson i afgrøden

## Advarsel

"Se [Goliath/Goltix SC 700](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Goliath/Goltix SC 700 til mindre anvendelse i Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas som jordmiddel

## Bekæmpelse

Bredbladet ukrudt.

## Dosering

Jordmiddel: 1,0 l/ha umiddelbart efter såning på fugtig jord til Convolvulus, Iberis, Centaurea, Cynoglossum, Chrysanthemum og Calendula.

0,75 l/ha umiddelbart efter såning til Gypsophila og Papaver.

## Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

## Bemærkninger

### Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

### Bemærkning fra Aarhus universitet Forskningscenter Flakkebjerg

Ingen bemærkninger.

### Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

15. oktober 2013