

**Brugsanvisning til mindre anvendelse af nedenstående  
metamitron-holdige midler mod ukrudt i prydplanterne  
*Convolvulus tricolor*, *Iberis sempevirens*, *Centaurea cyanus*,  
*Cynoglossum officinale*, *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula  
officinalis*, *Gypsophila elegans* og *Papaver rhoeas*  
til frøavl på friland**

**[Goltix SC 700](#) (396-22), ECP Metafol 700 (501-30),  
SweDane Metafol 700 (501-41), Metafol 700 (501-42)  
og Target 700 (501-27)**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Da SEGES P/S Plante og Miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES P/S Plante og Miljø ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

**Vejledning for Goltix SC 700 (396-22), ECP Metafol 700 (501-30), SweDane Metafol 700 (501-41), Metafol 700 (501-42) og Target 700 (501-27) mod ukrudt i prydplanterne *Convolvulus tricolor*, *Iberis sempevirens*, *Centaurea cyanus*, *Cynoglossum officinale*, *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Gypsophila elegans* og *Papaver rhoeas* til frøavl på friland**

*Ukrudtsmiddel:*

- Må kun anvendes mod ukrudt i prydplanterne *Convolvulus tricolor*, *Iberis sempevirens*, *Centaurea cyanus*, *Cynoglossum officinale*, *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Gypsophila elegans* og *Papaver rhoeas* som bladmiddel til behandling af ukrudt
- Max 1 L/ha per behandling og 3 L/ha per vækstår fordelt på max. 4 behandlinger pr. vækstår.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

*Advarsel:*

”Se Goltix SC 700, ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og Target 700 etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

**Brugsanvisning for Goltix SC 700, ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og Target 700 mod ukrudt i prydplanterne *Convolvulus tricolor*, *Iberis sempevirens*, *Centaurea cyanus*, *Cynoglossum officinale*, *Chrysanthemum carinatum*, *Calendula officinalis*, *Gypsophila elegans* og *Papaver rhoeas* til frøavl på friland**

**Som jordmiddel**

<b>Afgrøde</b>	<b>Skadegører</b>	<b>Max. dosering pr. behandling</b>	<b>Antal behandlinger pr. vækstår</b>	<b>Sprøjtetidspunkt</b>
Convolvulus, Iberis, Centaurea, Cynoglossum, Chrysanthemum og Calendula	Bredbladet ukrudt	1,0 L/ha	Max. 1, da afgrøden derefter vil være fremspiret	Umiddelbart efter såning.
Gypsophila og Papaver	Bredbladet ukrudt	0,75 L/ha	Max. 1, da afgrøden derefter vil være fremspiret	Umiddelbart efter såning på fugtig jord.

**Som bladmiddel**

<b>Afgrøde</b>	<b>Skadegører</b>	<b>a) Max. dosering pr. behandling b) Max. dosering pr. vækstår</b>	<b>Antal behandlinger pr. vækstår</b>	<b>Sprøjtetidspunkt</b>
Convolvulus, Papaver, Centaurea og Calendula	Bredbladet ukrudt	a) 1,0 L/ha b) 3 L/ha	Max. 4. De 4 behandlinger dækker den samlede anvendelse som jord- og bladmiddel. Bemærk at den maksimale dosering ikke må overskrides.	Afgrøde med minimum 2 løvblade. Fugtig jord fremmer effekten
Gypsophila, Chrysanthemum Cynoglossum og Iberis	Bredbladet ukrudt	a) 0,50 L/ha b) 3 L/ha	Max. 4. De 4 behandlinger dækker den samlede anvendelse som jord- og bladmiddel. Bemærk at den maksimale dosering ikke må overskrides.	Afgrøde med 2 løvblade. Fugtig jord fremmer effekten

*Risiko for skade:* For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.