

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Orius 200 EW (396-24) mod rust i alsikkekløver og kællingetand til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES Plante & Miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES Plante & Miljø ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Orius 200 EW mod rust i alsikkekløver og kællingetand til frøavl

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i alsikkekløver og kællingetand
- Halm og planterester må ikke bruges til opfodring
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Der må maksimalt anvendes 1,25 l pr. ha Orius 200 EW pr. ha pr. vækstår (1. august - 31. juli)
- Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringen nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringen beregnes forholdsmæssigt ud fra stoffernes maximale doser i de pågældende afgrøder jf. brugsanvisningen.

Advarsel

”Se midlets etikette: [Orius 200 EW](#)”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Orius 200 EW mod rust i alsikkekløver og kællingetand til frøavl

Bekæmpelse

Rustsygdomme i alsikkekløver og kællingetand til frøavl.

Dosering

Orius 200 EW: Der anvendes 0,75-1,25 l pr. ha i juni måned. Den maximale dosering på 1,25 l/ha kan splittes i 2 behandlinger.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 19. april 2016