

Brugsanvisning for anvendelse af Propulse SE 250 (reg. nr. 18-597) mod svampesygdomme i sukkerroer

Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 15. august til den 31. oktober 2022.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Propulse SE 250 mod svampesygdomme i sukkerroer. Propulse SE 250 indeholder aktivstofferne: Prothioconazol, 125 g/l og Fluopyram, 125 g/l.

Advarselstekst:

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod svampesygdomme i sukkerroer.
- Må ikke anvendes senere end 31. oktober 2022.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.
- Må i sukkerroer ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 49.
- Behandlede sukkerroer må bruges til fodring.
- Sprøjteførere skal anvende egnet arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning.
- Ved doseringen 2 x 0,6 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde på et sprøjtet område i maksimalt 2 timer dagligt.

Advarsel:

”Se etiketten til Propulse SE 250”

<https://www.cropscience.bayer.dk/~media/bayer%20cropscience/scandinavia/denmark/filer/produkter/etiketter-dk/propulse-etiket-dk.pdf>

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Sukkerroer	Bederust, bedemeldug, ramularia og bladplet	1,1 L/ ha	1	BBCH 31-49	Senest BBCH 49
		eller split behandling med 0,6 L/ha	2 (21 dage imellem de to behandlinger)		

Sprøjteteknik: Benyt 200-300 l vand pr ha, f.eks. med ISO 025 (lilla), 3 bar og 7 km/time eller ISO 03 (blå), 4 bar og 5,5 km/time.

Risiko for skade: Behandling med Propulse SE 250 medfører ikke afgrødeskade.

Bemærkninger: Manuel aflugning af stokløbere skal enten foretages før behandling med Propulse SE 250 eller hvis dette ikke er muligt, tidligst 10 dage efter behandling med Propulse SE 250.

Brugsanvisningen er

GODKENDT

11. august 2022

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Fraungrska Lind