

Откусывание хвоста – пригодность свиней для перевозки

Свиньи считаются пригодными для перевозки если

- при новых укусах: рана поверхностная и исключительно на коже
 - при более старых укусах: рана сухая и заживает (начальная стадия образования корки)
 - при заживших укусах: твердые корки ран и нет риска раскрытия во время транспортировки
- Нормальная походка и нормальное общее состояние животного в каждую ситуацию

Условная перевозка свиней

Свиней с хвостовой раной от укуса необходимо транспортировать отдельно от других животных:

- при свежей хвостовой ране, которая влияет на ткань, лежащую внизу
- при хвостовой ране с коркой и с риском раскрытия раны во время транспортировки, и следовательно рана начинает кровоточить.

Нормальная походка и нормальное общее состояние животного в каждую ситуацию

ПРИ КРОВОТОЧАЩЕЙ ИЛИ ВОСПАЛЕННОЙ ХВОСТОВОЙ РАНЕ ЗАПРЕЩЕНО СВИНЫЙ ПЕРЕВОЗИТЬ.

Как определяется пригодность свиней?



Рана сухая и зажившая – нет воспаления

Оценка: Пригодная для перевозки




Рана поверхностная и исключительно на коже

Оценка: Пригодная для перевозки




Рана сухая и зажившая

Оценка: Пригодная для перевозки



Более старая рана от укуса с новой раскрытой раной, включая и кожу и ткань, лежащую внизу, а бес воспаления.

Оценка: Условная пригодность для перевозки.



Свинья (7 кг) с хвостовой раной от укуса, очевидное воспаление

Оценка: Не пригодная для перевозки



Острая хвостовая рана от укуса с очевидным воспалением

Оценка: Не пригодная для перевозки

