

FORDELE OG ULEMPER VED TIDLIG SÅNING AF VINTERSÆD

Vurdér bestanden af græsukrudt, og så kun tidligt på arealer uden væsentlige problemer med græsser.

SÅTIDER

I vinterhvede, triticale og vinterrug opnås størst sikkerhed ved såning fra 1. september og frem. Ved tidlig såning forstås såning mellem 1. og 7. september.

Optimal såtid for vinterbyg er 10.-20. september. Såning før 10. september kræver, at du er særlig opmærksom på at tilpasse plantetallet og holder godt øje med bladlusene.

FORDELE VED TIDLIG SÅNING

- Udbyttet som gennemsnit af flere år er højere.
- Du får udjævnet arbejdsopgaverne i efteråret.
- Der er mindre risiko for overfladeafstrømning.
- Du kan anvende tidlig såning som alternativ til efterafgrøder.
- Bedre rodudvikling og buskning, som giver en større kvælstofoptagelse.

ULEMPER VED TIDLIG SÅNING

- Større variation i udbytterne mellem årene.
- Hvis der er meget græsukrudt i marken, bør der aldrig sås tidligt.
- Risikoen for goldfodsyge øges i vinterhvede med forfrugt korn ved tidlig såning.
- Risikoen for havrerødsot øges, da bladlus har længere tid til at overføre smitten.
- Øget risiko for lejesæd.
- Øget risiko for udvintring.
- Risikoen for sneskimmel i vintersæd og trådkølle (vinterbyg, er sjældent et problem) øges i kraftigt udviklede marker.
- Øget risiko for knækkefodsyge (ved vintersæd indenfor de sidste to år).

VED TIDLIG SÅNING SKAL DU ISÆR HUSKE

- Vælg de sorter, som bedst egner sig til tidlig såning, det vil sige sorter med relativ langsom udvikling og krybende vækst i efteråret.
- Så 2. års hvede til sidst.
- Overvej Latitudebejdset udsæd i vinterhvede for at mindske risikoen for goldfodsyge.
- Nedsæt plantetallet, så det tilpasses såtidspunktet. Den øgede buskning ved tidlig såning betyder, at der skal være færre planter.
- Vær opmærksom på, at der kan være et øget behov for mangansprøjtning.
- Vurdér behovet for bekæmpelse af sneskimmel i efteråret.
- Vurdér, om der er behov for vækstregulering i foråret.
- Septoria og rustsvampe fremmes af tidlig såning, mens meldug fremmes af sen såning.



FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES

Ved tidlig såning øger du risikoen for havrerødsot.



FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES

Ved tidlig såning er der større risiko for goldfodsyge i vinterhvede.



KONTAKT

Marian Damsgaard Thorsted, specialkonsulent
SEGES, PlantelInnovation
mdt@seges.dk
+45 8740 5447 / +45 2475 7914



KONTAKT

Lars Bonde Eriksen, landskonsulent
SEGES, PlantelInnovation
lbe@seges.dk
+45 8740 5366 / +45 3092 1730



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

