

# Молоко, не содержащее лекарств, – результат строгого соблюдения правил безопасного производства

Производство молока, не содержащего лекарств, является результатом соблюдения строгих правил маркировки коров, регистрации проводимого лечения и хранения молока в соответствии с рекомендациями Датской Федерации по Крупному Рогатому Скоту / Датским Советом по Молочной Продукции

## 1. Маркировка коров



Маркировка перед лечением:  
- Коров, у которых проявляются признаки болезни, необходимо маркировать перед лечением  
- Яловых коров, прошедших лечение, также необходимо маркировать



Помните, что красные ленты необходимо надевать на обе ноги, потому что:  
- Одна лента может слететь  
- Ленту на одной ноге несложно пропустить



В роботизированных системах производства молока:  
Всех коров, находящихся на лечении, необходимо маркировать красной лентой на хвостах.

**Не забывайте информировать ветеринара о количестве коров, применяемой маркировке и их местоположении в коровнике**

## 2. Регистрация лечения




Все медикаментозное лечение необходимо регистрировать, при чем, важно правильно указывать время удерживания молока от сдаивания и ставить на учет в соответствии с ветеринарной карточкой. Систематически берегайте ветеринарные карточки и обновляйте информацию после каждого лечения.



Четко информируйте всех доярок при помощи доски объявлений относительно того, какие коровы подвергались лечению и от какой коровы молоко следует удерживать и сдаивать в специальные емкости.

Систематически вносите информацию о любых изменениях на доску объявлений.

**Непонимание часто приводит к ошибкам производства!**



В роботизированных системах производства молока, а также других системах, управляемых компьютером, регистрируйте начало удерживания молока, как только принято решение о лечении.

Внимательно следите за правильной регистрацией времени удерживания.

## 3. Удерживание молока



Лучшим способом является применение отдельных доильных ведер с отдельными кистями и пульсатором.

Доильное ведро должно всегда быть соединено с вакуумной трубой, но ни в коем случае не с доильной линией.



Все части доильного ведра, соприкасающиеся с молоком от коров на лечении, необходимо после каждого применения подвергать очистке теплой водой и ополаскивать.



Если произошла ошибка, следует:  
- Связаться с компанией, которая принимает молоко  
- Установить красный запретный знак "стоп", информируя, таким образом, водителей автоцистерн о запрете сбора молока  
- Устранить собранное молоко, соблюдая местные законы по защите окружающей среды  
- Очистить и продезинфицировать цистерну