



UDRYD SALMONELLA DUBLIN

– i din **niveau 2-besætning**

Læg en handlingsplan for sanering

Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din besætningsdyrlæge og få foretaget en tilbundsgående undersøgelse af besættningens salmonellasituation. Herefter kan I sammen lægge en handlingsplan for sanering.

Handlingsplanen skal indeholde

- Målsætning for, hvornår ejendommen forventes at være i Salmonella Dublin-niveau 1
- Kortlægning af Salmonella Dublins udbredelse i alle besætninger på ejendommen. Det gøres med udgangspunkt i kortlægningsblodprøver for, om der er aktiv smitte.
- Kortlægning af smitteveje på ejendommen med udgangspunkt i en besættningsgennemgang og vurdering af risiko for smittespredning.
- Hygiejniske og driftsmæssige tiltag, der kan hindre smitte og nysmitte via de smitteveje, som blev identificeret i kortlægningen.
- Tiltag, der kan reducere risikoen for smittespredning til andre ejendomme: dyr på græs, gyllekørsel, transport mellem egne ejendomme, besøgende på ejendommen og maskinsamarbejde.
- Smittebegrænsende strategi for tilførsel af dyr. Plan for testning af kalve, kvier og evt. køer

Undgå smitten inden for besætningen

Du skal allerede nu sørge for smittebeskyttelse i din egen besætning og undgå smittespredning til andre. Smitten spredes især i stalde med dårlig hygiejne, høj belægning og sammenblanding af dyr. Det bedste, du kan gøre for at forhindre smittespredning, indtil du får lavet en handlingsplan, er derfor:

- Hold kælvningsboksen ren
- Flyt hurtigst muligt den nyfødte kalv til en rengjort kalveboks
- Placer kalveboksen i en separat afdeling, benyt gerne udendørs kalve-hytter
- Benyt holddrift, når dyrene flyttes til og i ungdyrstald
- Flyt kun til en rengjort og desinficeret boks
- Hav styr på hygiejnen: Vask drikke- og fodringsskåle dagligt. Hold fod- ringstrug og vandkar rene. Gå kun på fodergangen i renvaske-støvler. Hold bokse velstrøede
- Hold dyrene isoleret ved tegn på sygdom som diarré og lungebetændelse, da syge dyr udskiller mange bakterier.

Undgå at smitte andre besætninger

- Du må ikke sælge dyr til andre danske ejendomme med anden ejer
- Undgå at sprede smitten med husdyrgødning eller maskinfællesskab. For eksempel kan gyllevogn eller brug af maskinstation bringe smitten videre, hvis maskinerne ikke vaskes efter brug
- Skift tøj og fodtøj ved besøg i andre besætninger
- Ved afgræsning kan man sikre sig mod nabosmitte ved at etablere dobbelthege.

➔ Se eksempler på smitteveje, på bagsiden

Symptomer og smitte

Udbrud af Salmonella Dublin viser sig oftest hos kalve fra to uger til seks måneder samt hos nykælvere. Men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Symptomerne er feber, diarré, lungebetændelse, aborter samt akutte dødsfald hos de syge dyr. Syge dyr udskiller store mængder bakterier med gødningen, og en klat svarende til en teskefuld kan være nok til at smitte et andet kreatur. Smitten kan gemme sig i organisk materiale, som for eksempel gødning og gylle, hvor den kan overleve i flere år.

Læs mere om niveautildeling, sanering og Salmonella Dublin på www.salmonella.dk

