


Zweckmäßige persönliche Verhalten wenn MRSA festgestellt wird

- Was Sie selber tun können, um Beschwerden und Verletzungen zu minimieren

Wenn Sie Schweineproduzent sind

1. Wenn Sie oder ein Mitarbeiter positiv auf MRSA getestet sind, sollen Sie Mitarbeiter/Kollegen informieren
2. Informieren Sie zukünftiger und bestehender Mitarbeiter über MRSA
3. Verteilen Sie "Sicherheit bei MRSA 398"
4. Integrieren Sie persönliche Ansteckungsschutz in Ihrem Arbeitsplatzbewertung
5. Beurteilen Sie die Notwendigkeit einer Veränderung der Personaleinrichtungen



Wenn Sie schwanger werden

1. Fragen Sie Ihren Arzt einen Test auf MRSA zu machen zu Beginn des Mutterschaftsurlaubs, wenn Sie nicht mehr täglichen oder wöchentlichen Kontakt mit Schweinen haben
2. Bekommen Sie eine 5 Tage Behandlung mit desinfizierender Seife und antibiotischer Salbe bei Ihrem Arzt vor der Geburt.
3. Werden Sie ca. 21 Tagen nach Abschluss der Behandlung bei Ihrem Arzt getestet.

Wenn Sie sich verletzen

1. Hände mit Seife waschen, spülen und mit Einmalhandschuhe trocknen
2. Bedecken Sie die Wunde mit einem Pflaster
3. Gibt es Anzeichen einer Entzündung, fragen Sie Ihren Arzt

Wenn Sie oder einer Ihrer Haushalt Behandlung/Operation in einem Krankenhaus benötigen

1. Informieren Sie Ihren Arzt, dass Sie mit Schweinen arbeiten oder mit jemandem zusammenleben, der in der Schweineproduktion arbeitet.
2. Das Gesundheitspersonal wird Sie auf MRSA untersuchen, wenn Sie Ihren Zustand nicht kennen.
3. Bereiten Sie sich darauf im Einzelzimmer isoliert zu werden, wenn Sie MRSA-positiv sind und aufgenommen werden.