

# Двухэтапная свиноматка-кормилица

Если количество поросят в помете довольно большое после выравнивания помета, приходится делать двухэтапной свиноматки-кормилицы. Использование свиноматки-кормилицы обеспечивает, что у всех поросят шанс выживания. Необходимо, чтобы поросята сосали молозиво до перемещения к свиноматке-кормилице. По этому требуется, чтобы они были не моложе 6 часов. Опыт показывает, что использование двухэтапных свиноматок-кормилиц представляет наилучшее выживание поросят и самый хороший вес поросят при отъеме.

## Двухэтапная свиноматка-кормилица

Данный метод включает двух свиноматок. Первоначально найти свиноматку, которая готова для отъема своих поросят. К этой свиноматке перемещаются других поросят в возрасте 4-7 дней. К свиноматке, которая освободилась после этих 4-7 дней кормления грудью, сейчас перемещаются однодневных поросят, требующих свиноматки-кормилицы.



## Первоначально выбирать свиноматки для первого этапа

Выбирать свиноматки с поросятами, не моложе 28 дней, и отнимать поросят. Также возможно выбирать свиноматки с поросятами не моложе 21 дней, если поросята перемещаются в секционном и чистом цехе.

## Потом делать двухэтапной свиноматки-кормилицы

Выбирать свиноматки, имеющей 1.- или 2.- помет, и которая хорошо смотрела за своими поросятами за 4 – 7 дней. Все поросята этой свиноматки-кормилицы перемещаются к свиноматке первого этапа. Нельзя перемещать больше количество поросят к свиноматке первого этапа, чем Вы отняли от нее. Сейчас перемещаются больших новорожденных поросят к двухэтапной свиноматке-кормилице. Нельзя перемещать больше количество поросят к двухэтапной свиноматке-кормилице, чем она отдала свиноматке первого этапа.

