

## Cod de conduită în cazul diagnosticării cu stafilococi rezistenți la metilicină

- Ce puteți face pentru a minimiza neplăcerile și daunele.

### Dacă sunteți un crescător de porci

1. Dacă dumneavoastră sau un angajat al dumneavoastră a fost depistat cu *Staphylococcus aureus* metilicilino-rezistent (SAMR), trebuie să informați angajații/colegii
2. Informați-vă colegii prezenți și viitori despre implicațiile infectării cu SAMR.
3. Puneți la dispoziție lucrarea „Măsuri de siguranță în caz de SAMR 398 în turmele de porci”
4. Stabiliți o protecție personală contra infecțiilor în Evaluarea Locului de Muncă
5. Estimați dacă este nevoie ca dotările pentru angajați să fie schimbate



### Dacă rămâneți însărcinată

1. Cereți-i doctorului să vă facă un test de SAMR la începutul concediului maternal, atunci când numai aveți contact cu porcii zilnic sau săptămânal
2. Cereți doctorului un tratament de 5 zile cu săpun dezinfectant și unguent cu antibiotic înainte de a naște
3. Faceți teste la aproximativ 21 de zile după ce ați terminat tratamentul

### Dacă aveți leziuni

1. Spălați leziunile cu săpun, clătiți și uscați cu un prosop de hârtie
2. Acoperiți rana cu un plasture
3. Dacă rana prezintă semne de inflamare, contactați un doctor

### Dacă dumneavoastră sau cineva din fermă este pe cale de a suferi o intervenție/un tratament la spital

Comunicați doctorului faptului că lucrați cu porci sau locuiți cu cineva care lucrează într-o fermă de porci

1. Veți fi testat de SAMR dacă nu știți de ce anume suferiți
2. Pregătiți-vă să fiți pus într-o cameră separată dacă sunteți diagnosticat cu SAMR