

Свиноматки – кормление и оценка упитанности

Контроль над упитанностью

Равномерная средняя упитанность обеспечивает хорошую годность, низкое употребление кормов и низкий риск ран на лопатке. Хороший контроль над упитанностью требует индивидуальное кормление, и оценку упитанности у всех свиноматок в 1. 2. и 3.

месяце супоросности, и при опоросе и отъеме. Ежедневно провести визуальный контроль над упитанностью. 4 раза в год нужно проверять свою способность оценивания «средней упитанности» при измерении толщину спинного шпика у 20 свино маток - см. рис. 1.







Рис. 1. Измерение толщины проводится в пункте P2 около конечной точки последнего ребра. Измерите 7 см от середины спины. Для повышения точности, также измерите 7 см впереди этого пункта. Толщина спинного шпика указывается как среднюю сумму этих 2 измерения. При желании можно повторить измерения на другом боку свиноматки.




Средняя упитанность
Бедра и позвоночник
ощущаются при легком
нажатии руки.



Слишком упитанная
Бедра и позвоночник
полностью скрыты.



худая
Бедра и позвоночник
видны.



Слишком худая
Бедра и позвоночник
отчетливо видны.

Толщина спинного шпика у:

- Проверяемых свиноматок: 12-18 мм при осеменении
- Супоросных свиноматок: 15-20 мм
- Кормящих свиноматок: 14-18 мм при отъеме

Контроль над автоматической системой кормления

Регулярно проверить, что корма выдается в ожидаемом количестве. Эта проверка имеет особое значение для кормовых станций и систем кормления с мокрыми кормами.

Стратегии кормления

Проверяемые свиноматки необходимо ограничено кормить с 2,5 КЕсм (КЕ для свиноматок) в день, с момента веса около 60 кг. 14 дней до ожидаемого осеменения увеличить до 3,5 КЕсм в день.

Кормящие свиноматки кормить мин. 3 раза в день. Дать 2,5 Кесм в день при перемещении в цех опоросов. После опороса увеличить до прибл. 5 КЕсм в 7. дня кормления грудью. После этого кормить по аппетиту.

Супоросные свиноматки кормить один раз в день. Обычно выдать между 2-3 КЕсм, зависимо от упитанности. Последние 4 неделя до опороса следует увеличить с прибл. 0,5 КЕсм в день. Если температура в цехе отличается от 20°C, приходиться регулировать кормление с ±0,25 КЕсм / 5°C снижения/повышения температуры.